



Grippe : amorce de décrue

Selon les données du Réseau des GROG - semaine 08, du lundi 18 février 2013 au dimanche 24 février 2013

Après 10 semaines au-dessus du seuil épidémique utilisé par le Réseau des GROG l'activité grippale reste soutenue. Les 3 virus grippaux A(H1N1)pdm09, A(H3N2) et B continuent de co-circuler.

Cette co-circulation explique probablement la durée prolongée et la forte ampleur de cette épidémie.

Elle explique également que quelques personnes puissent être infectées simultanément ou successivement par deux virus grippaux différents.


La fréquence des recours aux soins de ville pour les infections respiratoires aiguës d'allure grippale est en baisse chez les généralistes comme chez les pédiatres.

Les vacances scolaires devraient favoriser la décrue épidémique.

Durant la semaine 08/2013, la grippe a été responsable d'environ 900.000 recours aux médecins généralistes et aux pédiatres (à comparer avec les 1.300.000 de la semaine précédente) .

Infections Respiratoires Aiguës et grippe


Estimation du nombre de consultations pour Infection Respiratoire Aiguë (IRA)
et détections/isolements de virus grippaux au sein des prélèvements GROG de la région
Période 2012/08 - 2013/08



Sources : Réseau GROG Midi-Pyrénées, Laboratoire de virologie du CHU de Toulouse

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en médecine générale et en pédiatrie
et nombre de virus grippaux isolés ou détectés dans la région

Période 2012/08 - 2013/08




Sources : Réseau GROG Midi-Pyrénées, Laboratoire de virologie du CHU de Toulouse

Bronchiolites du jeune enfant



Bronchiolites (< 2 ans)
vues par les Médecins Vigies GROG de la région
Période 2012/08 - 2013/08



□ Bronchiolite < 2 ans : **décru**

Source : Réseau GROG Midi-Pyrénées