



Grippe : au coeur de l'épidémie

Selon les données du Réseau des GROG - semaine 06, du lundi 4 février 2013 au dimanche 10 février 2013

La circulation des virus grippaux A et B se poursuit dans toutes les régions métropolitaines mais semble marquer le pas et l'activité des infections respiratoires aiguës a cessé sa progression.

Le nombre de détections de virus grippaux dans les prélèvements faits par les vigies GROG est de 50%, en légère baisse.


Actuellement encore un patient sur deux consultant pour une infection respiratoire aiguë en médecine générale ou en pédiatrie est un vrai cas de grippe.

C'est la huitième semaine d'épidémie mais on peut rappeler qu'au cours des 20 dernières saisons de surveillance du Réseau des GROG, la période la plus longue de franchissement du seuil épidémique a été de 12 semaines, en 1996/1997 (épidémie de grippe A(H3N2)).

Durant la semaine 06/2013, la grippe a été responsable d'environ 1.100.000 recours aux médecins généralistes et pédiatres (données non consolidées).


Infections Respiratoires Aiguës et grippe

Estimation du nombre de consultations pour Infection Respiratoire Aiguë (IRA)
et détections/isolements de virus grippaux au sein des prélèvements GROG de la région
Période 2012/06 - 2013/06



Sources : Réseau GROG Rhône-Alpes, CNR des virus Influenzae France Sud


Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en médecine générale et en pédiatrie
et nombre de virus grippaux isolés ou détectés dans la région
Période 2012/06 - 2013/06



Sources : Réseau GROG Rhône-Alpes, CNR des virus Influenzae France Sud

Bronchiolites du jeune enfant

Bronchiolites (< 2 ans)
vues par les Médecins Vigies GROG de la région
Période 2012/06 - 2013/06



Source : Réseau GROG Rhône-Alpes